

## SUPLEMENTO PARA MEIOS DE CULTURA

# Suplemento de Novobiocina

SS-00521

Também conhecido como Novobiocin supplement

FRASCO

**500 g**

## 01 APLICAÇÃO

Suplemento antibiótico recomendado para a identificação presuntiva de *Aeromonas hydrophila* em alimentos e rações animais.

## 02 COMPOSIÇÃO POR FRASCO

Novobiocina **5,00 mg**

(por frasco, suficiente para 250/1000 mL de meio)

## 03 PREPARO

Reidratar assepticamente o conteúdo de 1 frasco com 2 mL de água destilada estéril e adicionar assepticamente a 1000 mL de Meio Base RS estéril e fundido, ou a 250 mL de Caldo Base Soja Bile modificado ou de Caldo Base EC modificado. Homogeneizar bem e distribuir em placas de Petri estéreis.

Também é usado em 250 mL de Caldo Triptona de Soja modificado (m-TSB), de meio semissólido Rappaport-Vassiliadis modificado (MSRV) ou de Meio Rappaport-Vassiliadis Semissólido, Modificado.

## 04 CONSERVAÇÃO

Entre 2 e 8 °C.

## 05 SEGURANÇA E DESCARTE

Somente para uso em laboratório. Uso profissional. Produto não passível de registro na ANVISA. Leia o rótulo antes de abrir o frasco. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Siga as boas práticas de laboratório de microbiologia ao manusear amostras e culturas. Devem ser seguidas as precauções-padrão, conforme as diretrizes estabelecidas, no manuseio de amostras clínicas. As orientações de segurança podem ser consultadas na ficha com dados de segurança (FDS) do produto.

### DESCARTE

O usuário deve garantir o descarte seguro, por autoclavagem e/ou incineração, das preparações usadas ou inutilizáveis deste produto. Siga os procedimentos laboratoriais estabelecidos para o descarte de materiais infectantes. O material que entrar em contato com amostras clínicas deve ser descontaminado e descartado de acordo com as técnicas laboratoriais vigentes.